

При выявлении родителями каких-либо из вышеуказанных симптомов необходимо обратиться к врачу



К какому врачу обращаться в таком случае?

Заподозрить аутизм может любой специалист.

Первичное обращение возможно к педиатру, невропатологу, а также к психологу.

Если врач предполагает диагноз: **Аутизм**, ребенок будет направлен к **психиатру на консультацию**.

Родители могут сами обратиться к **психиатру для диагностики** состояния своего ребенка.



Диагноз Аутизм может выставить только врач Детский психиатр!!!

Лечение Аутизма включает в себя комплексное использование медикаментозных и немедикаментозных методов лечения.

Большое значение имеет коррекционная работа с ребенком (психологи, педагоги, дефектологи и социальные работники).

Назначение Медикаментозного лечения может решить только **врач детский психиатр** по ПОКАЗАНИЯМ.

Обязательно необходима психообразовательная и социальная работа с семьей пациента, которая является одним из основополагающих принципов ведения детей с РАС.

Что нам нужно знать об **АУТИЗМЕ?**



это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами, повторяющимися действиями.

Все указанные признаки начинают проявляться с ранних лет жизни (в возрасте до трёх лет)



Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра.

Ранние признаки расстройств аутистического спектра в возрасте до одного года:



Ранние признаки расстройств аутистического спектра в возрасте после одного года:

- отсутствие речи или недоразвитие речи (словарный запас довольно скудный для возраста ребёнка; мало согласных звуков в речи; он реже комбинирует слова);



- речь монотонная, "писклявый" голос;

- редко жестикулирует при разговоре;

- неумение выполнять простые инструкции;

- отсутствие взаимодействия с окружающими, включая сверстников и членов семьи;

- стереотипные игры – раскручивание колёсиков машин, стройка предметов в ряд или по цвету;



- нет интереса к играм со сверстниками, предпочтение играть в одиночестве.



- перебирание пальцев, повторяющиеся движения в виде прыжков на месте, бега от стенки к стенке, бега по кругу, кружения вокруг своей оси, хождения на цыпочках и так далее;

- реже обращается с просьбами и делится своими переживаниями;

- автоматически повторяет слова за говорящим;

- ребенок не здоровается с родителями и гостями;

- могут смотреть в одну точку при общении с детьми или взрослыми;

- могут произносить бесконечные монологи на какую-либо тему, не замечая реплик окружающих;

- испытывают потребность в однообразии;

- сопротивляются любым переменам в одежде, в игрушках, в обстановке;

- склонны избегать прикосновений, не смотреть на партнёра, не улыбаться при взаимодействии с людьми;



- может быть аутоагрессия (нанесение повреждений себе), которая может привести к ранениям ребенка (например: кусает себя, царапает).